

En septembre

À la Sainte Edith,
la pluie n'est pas maudite !

AU POTAGER

1. Semez les engrais verts sur les emplacements libres
⊕ Ils améliorent et enrichissent la structure du sol et empêchent les herbes indésirables de s'installer. Vous les enfouirez pendant l'hiver.
2. Semez, avant le 15, en pleine terre, en pépinière, les oignons blancs
⊕ Dans un sol non fumé depuis au moins 1 an, ni après un engrais vert car ils redoutent l'azote.
3. Récoltez, en fin de mois, toutes les tomates
⊕ Laissez-les mûrir sur un rebord de fenêtre ou dans des cagettes dont le fond est garni d'un papier absorbant.
4. Lutte énergiquement contre les herbes adventices dont la croissance redouble de vigueur ce mois-ci
⊕ Évitez l'emploi d'herbicides qui affaiblissent les micro-organismes présents dans le sol, le désherbage à la main restant le meilleur.
5. Triez les pommes de terre, puis stockez-les dans un endroit aéré afin d'éviter la pourriture
⊕ Consommez les plus petites en premier, celles-ci se rident plus vite.
6. Dans le Midi : terminez les plantations d'artichauts
⊕ Espacez les pieds de 1 m dans tous les sens, le collet au niveau du sol et arrosez.



Pomme atteinte de moniliose

AU VERGER

1. Récoltez encore les pommes, poires, pêches, prunes... et le raisin au fur et à mesure de vos besoins
⊕ Pour le conserver, coupez les grappes en gardant un morceau de sarment d'environ 10cm.
2. Rajeunissez les pruniers âgés
⊕ Supprimez les branches sèches en coupant au-dessus d'un œil ou d'un gourmand (rameau qui se développe verticalement à partir d'un œil à bois) ainsi que celles de l'intérieur de la ramure de façon qu'elles ne se gênent pas.
3. Surveillez les attaques de moniliose qui se manifestent par l'apparition de taches noires ornées de cercles concentriques accompagnés ou non de pustules blanches
⊕ Éliminez les fruits atteints, brûlez-les ou jetez-les.
4. Enlevez les herbes indésirables aux pieds des arbres fruitiers.
5. Repérez les branches mortes ainsi que celles qui sont malingres
⊕ Afin de faciliter leur suppression quand il n'y aura plus de feuilles.
6. Traitez, à la bouillie bordelaise, les pommiers pêchers, abricotiers et cerisiers
⊕ Dès que la récolte est terminée pour empêcher la venue de maladies avant l'hiver.

Les chaleurs estivales sont derrière nous et la végétation va enfin pouvoir respirer. Nous nous acheminons vers la fin de l'été.



Trefle incarnat

EN AGRÈMENT

1. Semez le gazon dont le terrain a été préparé le mois dernier, la terre est encore chaude, ce qui favorisera une levée rapide et un bon enracinement avant l'hiver
⊕ Répartissez les graines de manière très régulière et recouvrez-les légèrement avec un râteau. Tassez avec un rouleau, arrosez.
2. Scarifiez la pelouse déjà établie afin de la fortifier avant l'hiver
⊕ Cette opération permet d'éliminer la mousse, les herbes sèches et d'aérer le sol.
3. Cessez progressivement d'arroser toutes les plantes tubéreuses et bulbeuses : lis, capucines, arums, dahlias, bégonias...
⊕ Les plantes ont besoin de beaucoup plus d'eau au printemps et en été qu'en automne.
4. Vérifiez les attaches des dahlias, delphiniums et autres plantes exigeant un tuteurage
⊕ A cause du vent et pluies d'automne.
5. Taillez les haies de thuyas
⊕ De nouvelles pousses vont apparaître et combler les zones dégarnies
⊕ Gardez les déchets pour pailler les pieds, ce qui limitera les excès d'eau néfastes à ces conifères.
6. Balcons et terrasses : Nettoyez régulièrement les plantes fleuries et les jardinières.

APICULTURE

- Après une année en dents de scie avec des périodes de froid et de canicule, les colonies doivent se reconstituer pour passer un bon hivernage : colonie populeuse avec de jeunes abeilles, provisions en suffisance, absence de maladie et antiparasitage effectué (varroas).
- Visite d'hivernage : procéder à la visite d'automne très méticuleusement et en fonction de vos observations, réagir comme suit.
 - Adaptation des volumes à la population ; mettre en ruche 6 cadres les petites colonies (éviter les ruches 10 C cloisonnées).
 - Nourrir si nécessaire (sirop) : si les provisions en miel représentent moins de 15 kg de miel (20 kg pour les hybrides), préférer les sirops spéciaux. Éviter le sucre cristallisé (saccharose) qui demande beaucoup



Piégeage des frelons asiatiques

En octobre

Sainte Thérèse

Octobre en bruisse, hiver en ruine

AU POTAGER

1. Plantez, en pleine terre, en place, les oignons blancs semés le mois dernier dès que leurs feuilles ont atteint 15 à 20 cm de haut (raccourcissez celles-ci ainsi que les racines à 1 cm du bulbille), de préférence sur une petite butte car ils n'aiment pas l'humidité ainsi que les laitues d'hiver semées à la même période
⊕ Ils seront à protéger en cas de grand froid.
2. Récoltez les dernières betteraves, navets d'hiver
⊕ Conservez-les dans une caisse avec du sable et stockez en cave ou dans un local hors-gel.
3. Nettoyez les planches libres du potager
⊕ C'est agréable à l'œil et efficace contre la prolifération des herbes indésirables.
4. Dégagez le sol entre les rangs d'artichauts
⊕ En prévision du buttage et de l'installation de la protection ultérieurs.
5. Récoltez les haricots secs, écossez-les puis placez le tout dans un récipient à mettre au congélateur 2 à 3 semaines (afin de tuer les éventuelles larves de bruche)
⊕ Stockez ensuite en cave ou un local frais dans des bocaux où, pour éloigner tout risque, vous ajouterez 2 à 3 gousses d'ail.
6. Semez les épinards d'hiver
⊕ À une exposition légèrement ombragée.



Haricots en grains

d'énergie pour être réduit en glucose/fructose et produit des déchets.

- Traiter contre la varroase : avec les produits fournis par votre groupement apicole selon le PSE en vigueur dans votre région.
 - Éliminer les colonies malades (loques, nosémose, ...) : avec éventuellement la déclaration des maladies réputées contagieuses.
 - Effectuer votre déclaration annuelle de ruches : selon les procédures habituelles dont « téléruchers », entre le 1 septembre et le 31 décembre (nouvelle réglementation européenne).
 - Accentuer le piégeage des frelons asiatiques : dans les zones infestées, les fondatrices font leur réserve de gras en automne pour mieux hiberner en prélevant les butineuses.

L'hiver sera bientôt là ! Les températures commencent à chuter et déjà les premiers signes de l'automne ne trompent pas. Les arbres se parent de leurs couleurs chatoyantes.



Pavots fanés

EN AGRÈMENT

1. Nettoyez les plates-bandes dès qu'elles se libèrent et prenez soin d'étiqueter les souches des vivaces
⊕ Taillez légèrement la lavande afin d'avoir une plante au port ramifié et bien dense. Supprimez les feuilles et fleurs fanées, sarclez puis épandez du compost.
2. Arrachez ce qui reste de plantes annuelles
⊕ Au fur et à mesure qu'elles se fanent.
3. Plantez les azalées et rhododendrons
⊕ Arrosez généreusement les mottes et trous de plantation. Ces plantes ont besoin d'un maximum d'humidité pour bien reprendre.
4. Multipliez les pivouines
⊕ Déterrez la souche, divisez-la en veillant à ce que les éclats comportent 3 départs de tiges. Replantez, les yeux enterrés sous 5 cm de terre (au-delà, il risque de ne pas avoir de floraison).
5. A la fin du mois, buttez le pied de tous les rosiers
⊕ Afin de protéger le point de greffe.
6. Balcons et terrasses : Toilettiez les plantes avant de les rentrer
⊕ Coupez les tiges et fleurs fanées, nettoyez le fond des jardinières, renouvelez la terre.

AU VERGER

1. Récoltez tous les fruits mûrs ou qui achèveront leur maturation sous abri : pommes, poires, nèfles...
⊕ Évitez d'entreposer dans le même local les pommes et poires avec d'autres fruits, elles accélèrent le mûrissement des autres et altèrent leur conservation.
2. Traitez préventivement contre la moniliose, à la bouillie bordelaise, les arbres à noyaux (pêchers, pruniers et cerisiers)
⊕ Juste après la chute des feuilles.
3. Surveillez les écoulements de gomme sur les troncs ou branches de pruniers, ce sont les signes d'une attaque de moniliose
⊕ Ce champignon peut provoquer un début de chancre, si des petites branches sont atteintes, coupez-les. Sur les troncs, il est inutile d'intervenir, la maladie n'évoluera pas.
4. Traitez les pêchers contre la cloque, à la bouillie bordelaise
⊕ Quand les 2/3 des feuilles sont tombées.
5. Commencez la récolte des kiwis, en fin de mois, et surtout avant le gel
⊕ Cueillez le fruit, alors qu'il est encore ferme, et laissez-le mûrir à la température constante de la pièce (inférieure à 10°C). Son duvet verdâtre passe alors au brun.
6. Repérez les branches mortes ou celles qui déséquilibrent la ramure des vieux arbres fruitiers
⊕ Dans quelques semaines, vous ne saurez plus qui étaient vivants ou secs.